



ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Cognome paziente: \_\_\_\_\_ Nome paziente: \_\_\_\_\_

# INFORMATIVA PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME DI TAC SENZA E CON MEZZO DI CONTRASTO

Tutti i pazienti che devono eseguire esami che prevendono la somministrazione di mezzo di contrasto organo iodato (TC) devono esibire gli esami di laboratorio con azotemia e creatinina effettuati non oltre 30 giorni prima.

Gli stessi esami vanno esibiti dai pazienti nefropatici che devono eseguire esami con somministrazione di mezzo di contrasto a base di gadolinio.

È necessario rispettare il digiuno da almeno 6 ore prima di effettuare esami con mezzo di contrasto

#### **In caso di anamnesi positiva per:**

- Atopia, asma, allergia a cibi e farmaci
  - Allergia al lattice
  - Trattamento con beta-bloccanti
  - Trattamento con interleuchina 2

Il paziente adulto deve fare premedicazione con prednisone 50mg 13 ore, 7 ore e 1 ora prima della somministrazione, quello pediatrico prednisone 1mg/Kg/die per tre giorni compreso quello dell'intervallo\*\*

- Mieloma multiplo idratazione 12 ore prima

#### In pazienti in terapia con:

- Metformina se eGFR<45 ml/min. devono sospendere 48 ore prima dell'esame e riprendere 48 ore dopo;
  - Ciclosporina, aminoglicosidi e FANS sospendere almeno 24 ore prima;
  - Cisplatino, sospendere almeno 7 gg prima;
  - Neurolettici, analgesici, antistaminici e sedativi del gruppo fenotiazinico sospendere 48 ore prima e riprendere 12 ore dopo l'esame.

**\*\*Contattare l'UO che deve effettuare la prestazione almeno 7 gg prima in caso di dubbio sul percorso.**

ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO

## Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Cognome paziente: \_\_\_\_\_ Nome paziente: \_\_\_\_\_

### ALLEGATO E PER LA RADIOLOGIA

INFORMAZIONI CLINICO-ANAMNESTICHE PER EFFETTUARE ESAMI CHE PREVEDONO  
SOMMINISTRAZIONI DI MEZZO DI CONTRASTO

Storia Clinica di reazioni avverse moderate o severe a mezzi di contrasto:\*

Organoiodati (TC)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO
Contenenti gadolinio (RM)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO

---

Informazioni utili per la stratificazione del rischio:

- Atopia, asma allergia a cibi, farmaci o lattice\*\*  SI  NO  NON SO
- Cardiopatia (Angina, insufficienza cardiaca, stenosi aortica severa, ipertensione polmonare primitiva, cardiomiopatie severe anche se compensate)  SI  NO  NON SO
- Storia di patologia o pregressa chirurgia renale  SI  NO  NON SO
- Lupus Eritematoso Sistemico  SI  NO  NON SO

**Solo per pazienti da sottoporre a esame TC con MDC:**

- Feocromocitoma\*  SI  NO  NON SO
- Ipertiroidismo o patologia tiroidea  SI  NO  NON SO

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Timbro e firma del medico curante

---

\* In caso di dubbio contattare l'Unità Operativa (UO) che dovrebbe effettuare la prestazione per valutarne la praticabilità;

\*\*in caso di dubbio contattare l'UO che deve effettuare la prestazione almeno 7 gg prima per concordare modalità premedicazione